

Suppl. 1. Pediatric Quality of Life Inventory 3.0 end-stage renal disease module child-self report item content (Korean version)^{21)*}

Scale	Item
1) 일반적인 피로감(General fatigue)	1. 나는 피곤하다.
	2. 나는 육체적으로 약하다. (강하지 않다)
	3. 나는 너무 피곤해서 내가 하고 싶은 일을 할 수 없다.
	4. 나는 너무 피곤해서 친구들과 시간을 보낼 수 없다.
2) 내 신장병에 관하여>About my kidney disease)	1. 나는 얼굴이 부었다.
	2. 나는 어지럽다.
	3. 나는 머리가 아프다.
	4. 나는 목이 마르다.
	5. 나는 쥐가 난다.
3) 치료하면서 생기는 문제(Treatment problems)	1. 나는 약 먹는 것을 기억하기가 힘들다.
	2. 나는 약을 먹고 나면 기분이 좋지 않다.
	3. 나는 액체로 된 약을 먹기가 힘들다.
	4. 나는 먹고 싶은 음식을 먹지 못할 때 속상하다.
4) 가족 및 교우 관계(Family and peer interaction)	1. 나는 다른 사람들이 내 병을 이해하지 못할 때 힘들다.
	2. 나는 치료(투석) 때문에 가족들과 무언가를 함께 할 수 없다.
	3. 나는 치료(투석) 때문에 친구들과 함께 하는 운동에서 제외된다고 느낀다.
5) 걱정(Worry)	1. 나는 약물치료가 잘 되고 있는지 걱정이다.
	2. 나는 수술 받는 것이 걱정이다
	3. 나는 오랫동안 아플까 봐 걱정이다
	4. 나는 입원해야 될까 봐 걱정이다
	5. 나는 내 혈압이 걱정이다
	6. 나는 약을 안 먹으면 아플까 봐 걱정이다
	7. 나는 체중이 걱정이다
	8. 나는 감염될 까 봐 걱정이다
	9. 나는 주사바늘에 찔리는 것이 걱정이다 (예, 주사, 혈액검사, 정맥주사)
	10. 나는 혈액검사 결과가 걱정이다
6) 보여지는 신체 모습(Perceived physical appearance)	1. 나는 다른 사람들이 내 흉터를 보는 것이 싫다
	2. 나는 또래만큼 나이 들어 보이지 않는다
	3. 나는 내 약이 내 모습을 변화시켜 당황스럽다
7) 의사소통(Communication)	1. 나는 내가 치료과정에서 느낀 점을 의사나 간호사에게 말하기가 어렵다.
	2. 나는 의사나 간호사에게 질문하기가 어렵다.
	3. 나는 내가 치료과정에서 느낀 점을 병원의 다른 사람들 (예, 영양사, 사회 복지사)에게 말하기가 어렵다.
	4. 나는 내 병을 다른 사람에게 설명하기가 어렵다.
	5. 나는 내가 치료과정에서 느낀 점을 부모에게 말하기가 어렵다.

*Reference 21 in main text: Park KS, Hwang YJ, Cho MH, Ko CW, Ha IS, Kang HG, et al. Quality of life in children with end-stage renal disease based on a PedsQL ESRD module. *Pediatr Nephrol* 2012;27:2293-300.